



PENTAGEN LIQUID

PATIENT INFORMATION LEAFLET

SCHEDULING STATUS S0

PROPRIETARY NAME, STRENGTH AND PHARMACEUTICAL FORM

Pentagen (Liquid)

Read all of this leaflet carefully because it contains important information for you

Pentagen is available without a doctor's prescription for you to treat mild conditions. Nevertheless you still need to use Pentagen carefully to get the best results from it.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- Do not share Pentagen with any other person.
- Ask your pharmacist or healthcare practitioner if you need more information or advice.
- You must see a healthcare practitioner if your symptoms worsen or do not improve within one week.

1. WHAT PENTAGEN CONTAINS

The active ingredients in Pentagen are *Pelargonium sidoides radix* 80 g, *Ferrum phosphoricum* 6CH, *Hydrastis canadensis* 6CH, *Kalium bichromicum* 6CH, *Mercurius solubilis* 6CH, *Natrium muriaticum* 6CH, *Polygala senega* 3CH, *Pulsatilla vulgaris* 30CH, *Sambucus nigra* 6CH. The other ingredients are ethanol, glycerol and purified water.

Preservative: 15 % Ethanol, Glycerol 42 %. Sugar free.

2. WHAT PENTAGEN IS USED FOR

Pentagen helps to relieve the main symptoms of colds and flu: blocked and runny nose, painful sinuses, sore throat and cough.

3. BEFORE YOU TAKE PENTAGEN

Do not take Pentagen

- If you are hypersensitive (allergic) or intolerant to any of the active ingredients or other ingredients in Pentagen.

Take special care with Pentagen:

- Please consult your healthcare practitioner if your symptoms are severe or do not improve within one week.
- If you experience an allergic reaction after taking Pentagen, discontinue use and consult your healthcare practitioner.
- If you want to substitute existing medical treatment, please consult your doctor or healthcare practitioner before doing so.

Taking Pentagen with food and drink

Do not take Pentagen within half an hour of strong coffee, chocolate, camphor or aromatic substances as these may reduce the efficacy of the homeopathic components.

Pregnancy and breastfeeding

It is not recommended to use Pentagen during pregnancy and lactation as safety has not been established.

Driving and using machinery

Pentagen does not interfere with your ability to drive or use machinery.

Important information about some of the ingredients

Pentagen contains ethanol. Patients with a sensitivity or intolerance to alcohol should not take Pentagen.

Using other medicines with Pentagen

Always tell your healthcare practitioner if you are taking other medicines. (This includes complementary or traditional medicines.) Pentagen is not known to interact with other medicines.

4. HOW TO TAKE PENTAGEN

Do not share medicines prescribed for you with any other person. Always check with your pharmacist or healthcare practitioner if you are unsure how to take this medicine. The drops should be taken on the tongue or diluted in a little water. As absorption takes place through the mucous membrane of the mouth, it is desirable to hold the medicine in the mouth for a short time. The mouth should be free of other strong tastes (e.g. toothpaste, peppermint, etc.) when taking the medicine. To dispense the drops, twist off the screw cap breaking the seal with first use. Ensure the arrow on the top of the dropper insert is facing down towards your tongue or container with water to ensure a continuous flow of drops.

The usual dosage is:

Adults and children over 12 years: Take 30 drops (1,5 ml) three times daily.
Children 6 to 12 years: Take 20 drops (1,0 ml) three times daily.
Children under 6 years: Take 10 drops (0,5 ml) three times daily.

For best results, start taking Pentagen at the first signs of cold or flu and take the product for at least 5 days. Continue to take for at least 2 to 3 days after symptoms have abated.

If you take more Pentagen than you should

Glycerol may have a mild laxative effect at high doses. If a side effect is experienced following an overdose, consult your healthcare practitioner or pharmacist. If neither is available, contact the nearest hospital or poison control centre.

If you forget to take a dose of Pentagen

Do not take a double dose to make up for forgotten individual doses.

5. POSSIBLE SIDE EFFECTS

If you are sensitive to glycerol, you may experience headaches, dizziness, bloating, nausea, vomiting, thirst or diarrhoea at high doses of glycerol. Anecdotal reports indicate that there may be an initial worsening of symptoms over the first 2 to 3 days with a sudden clearing up of the condition. Should your general health worsen or if you experience any untoward effects while taking this medicine, please consult your healthcare provider for advice.

6. STORING AND DISPOSING OF PENTAGEN

Store at or below 25 °C in a cool, dry place protected from light and moisture. Keep the container tightly closed. Do not store in a bathroom. **Store all medicines out of the reach of children.** Return all un-used medicines to your pharmacist.

7. PRESENTATION OF PENTAGEN

Pentagen drops are available as 50 ml liquid packed in an amber glass bottle with dropper insert and white HDPE tamper-evident screw-on cap.

8. IDENTIFICATION

Pentagen drops is a clear, amber, slightly viscous liquid with an glycerol-herbal taste and herbal-alcohol aroma.

9. REFERENCE NUMBER

Registry No 42067 (GN 23128 / February 2002)

10. NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

CoMED Health (Pty) Ltd., 313 Kuit Street, Waltloo, Pretoria, 0184.
www.comedhealth.co.za (See also www.natura.co.za)
Tel: 012 813 9400

11. DATE OF PUBLICATION

December 2017

12. COMPLEMENTARY MEDICINE

Herbal - Homeopathic combination medicine

Disclaimer: This unregistered medicine has not been evaluated by the SAHPRA for its quality, safety or intended use.



PENTAGEN DRUPPELS PASIËNTINLIGTINGSBLAD

SKEDULERINGSSTATUS

S0

HANDELSNAAM, STERKTE EN DOSERINGSVORM

Pentagen (Druppels)

Lees hierdie inligtingsblad sorgvuldig deur want dit bevat belangrike inligting vir jou

Pentagen is beskikbaar sonder 'n doktersvoorskrif vir geringe toestande. Tog moet Pentagen noukeurig gebruik word om die beste resultate daaruit te kry.

- Bewaar hierdie inligtingsblad. Dit mag nodig wees om dit weer te lees.
- Moet nie Pentagen met enige ander persoon deel nie.
- Vra jou apteker of gesondheidspraktisyn as jy meer inligting of advies benodig.
- Jy moet 'n gesondheidspraktisyn sien as jou simptome vererger of nie binne een week verbeter nie.

1. WAT PENTAGEN BEVAT

Die aktiewe bestanddele in Pentagen is *Pelargonium sidoides radix* 80 g, *Ferrum phosphoricum* 6CH, *Hydrastis canadensis* 6CH, *Kalium bichromicum* 6CH, *Mercurius solubilis* 6CH, *Natrium muriaticum* 6CH, *Polygala senega* 3CH, *Pulsatilla vulgaris* 30CH, *Sambucus nigra* 6CH. Die ander bestanddele is etanol, gliserol en gesuiwerde water. Preserveremiddel: 15 % Etanol, 42 % Gliserol. Suikervry.

2. WAARVOOR PENTAGEN GEBRUIK WORD

Pentagen help om die hoof simptome van verkoue en griep te verlig: geblokkeerde en loopneus, pynlike sinusse, seer keel en hoës.

3. VOORDAT JY PENTAGEN GEBRUIK

Moet nie Pentagen neem

- Indien jy allergies of hipersensitief is teenoor enige van die aktiewe bestanddele van Pentagen of dit nie kan verdra nie.

Wees veral versigtig met Pentagen:

- Raadpleeg asseblief jou gesondheidspraktisyn indien jou simptome ernstig is of voortduur sonder verbetering vir langer as een week.
- Stop die gebruik van Pentagen dadelik en raadpleeg jou gesondheidspraktisyn indien jy 'n allergiese reaksie ervaar nadat jy Pentagen geneem het.
- As jy bestaande mediese behandeling wil vervang, raadpleeg jou dokter of gesondheidspraktisyn voordat jy dit doen.

Gebruik van Pentagen saam met voedsel en vloeistowwe

Moet nie Pentagen binne 'n halfuur neem van sterk koffie, sjokolade, kamfer of aromatiesse stowwe nie, aangesien dit die effektiwiteit van die homeopatiese komponente kan verminder.

Swangerskap en borsvoeding

Dit word nie aanbeveel om Pentagen tydens swangerskap en laktasie te gebruik nie aangesien veiligheid nie vasgestel is nie.

Die gebruik en bestuur van masjinerie

Die gebruik van Pentagen beïnvloed nie 'n mens se vermoë om masjinerie te bestuur en veilig te gebruik nie.

Belangrike inligting oor sommige van die bestanddele

Pentagen bevat etanol. Pasiënte met 'n sensitiwiteit of onverdraagsaamheid teenoor alkohol moet nie Pentagen neem nie.

Gebruik van ander medisyne saam met Pentagen

Vertel altyd jou gesondheidspraktisyn as jy ander medisyne gebruik. (Dit sluit komplementêre of tradisionele medisyne in.) Dit is nie bekend dat Pentagen met ander medisyne reageer nie.

4. HOE OM PENTAGEN TE GEBRUIK

Moenie medisyne wat vir jou voorgeskryf is, met enige ander persoon deel nie. Raadpleeg altyd jou apteker of gesondheidspraktisyn indien jy nie seker is hoe om hierdie medisyne te gebruik nie. Die druppels moet op die tong geneem word of in 'n bietjie water verdun word. Aangesien absorpsie deur die slymvlies van die mond plaasvind, is dit wenslik om die medisyne vir 'n kort tyd in die mond te hou. Die mond moet vry wees van ander sterk smake (bv. tandepasta, peperment, ens.) wanneer die medisyne geneem word. Om die druppels te gebruik, skroef die skroefprop af en breek die sekerheidseël. Maak seker dat die pyltjie op die bokant van die drupper af wys na die tong of die houer met bietjie water om 'n deurlopende vloei van die druppels te verseker.

Die gewone dosis is:

Volwassenes en kinders ouer as 12 jaar: Neem 30 druppels (1,5 ml) drie keer daaglik.

Kinders 6 tot 12 jaar: Neem 20 druppels (1,0 ml) drie keer daaglik.

Kinders onder 6 jaar: Neem drie druppels (0,5 ml) drie keer daaglik.

Vir die beste resultate, begin Pentagen by die eerste tekens van koue of griep en neem die produk vir ten minste 5 dae. Hou aan vir ten minste 2 tot 3 dae nadat simptome afgeneem het.

Indien jy meer Pentagen gebruik as wat nodig is

Gliserol kan 'n ligte lakseermiddel effek by hoë dosisse hê. Indien jy 'n nuwe-effek ervaar, raadpleeg jou gesondheidspraktisyn of apteker. Indien hulle nie beskikbaar is nie, kontak die naaste hospitaal of gifbeheersentrum.

As jy vergeet om 'n dosis Pentagen te neem

Moet nie 'n dubbeldosis neem om vir 'n oorgeslaande dosis van Pentagen op te maak nie.

5. MOONTLIKE NUWE-EFFEKTE

As jy sensitief is vir gliserol is, kan jy hoofpyn, duiseligheid, opgeblasenheid, naarheid braking, dors of diarree by hoë dosisse gliserol ervaar. Anekdotiese verslae dui daarop dat daar dalk 'n aanvanklike verergering van simptome oor die eerste 2 tot 3 dae met 'n skielike opruiming van die toestand. Indien jou algemene gesondheid versleg of indien jy enige nuwe-effekte ondervind wanneer jy hierdie medisyne gebruik, raadpleeg jou gesondheidspraktisyn of apteker vir advies.

6. BERGING EN VERNIETIGING VAN PENTAGEN

Bewaar by of benede 25 °C in 'n koel, droë plek en beskerm teen lig en vog. Hou die houer dig gesluit. Moenie in 'n badkamer stoor nie. **Hou alle medisyne buite bereik van kinders.** Stuur alle ongebruikte medisyne aan jou apteker terug.

7. AANBIEDING VAN PENTAGEN

Pentagen druppels is beskikbaar as 50 ml vloeistof wat in 'n amber glasbottel met drupper inleg en wit HDPE skroefpropie met 'n sekerheid seel verpak is.

8. IDENTIFIKASIE

Pentagendruppels is 'n helder, amber, effens viskose vloeistof met 'n gliserol-kruie smaak en kruie-alkohol aroma.

9. VERWYSINGSNUMMER

Registry No 42067 (GN 23128 / February 2002)

10. NAAM EN ADRES VAN DIE APPLIKANT

CoMED Health (Pty) Ltd., Kuitstraat 313, Waltloo, Pretoria, 0184.
www.comedhealth.co.za (Sien ook www.natura.co.za), Tel: 012 813 9400

11. DATUM VAN PUBLIKASIE

Desember 2017

12. KOMPLEMENTÊRE MEDISYNE

Kruie - Homeopatiese kombinasie medisyne

Vrywaring: Hierdie ongeregistreerde medisyne is nie deur SAHPRA vir sy kwaliteit, veiligheid of voorgestelde gebruik geëvalueer nie.